

OPERACE TŘÍSELNÉ KÝLY U DĚTÍ

Poj.:

Strana 1 / 4

DG:

Č.chorobopisu:

Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče,

vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku. Seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout a dát k provedení zákroku svůj souhlas.

Zákonný zástupce pacienta: - - -

Lékař, který provedl poučení: FlexFormClientExt

Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče,

vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku. Seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout a dát k provedení zákroku svůj souhlas.

Účel, povaha a důsledky výkonu:

Tříselná kýla je nejčastější chirurgický problém u kojenců a dětí projevující se vyklenutím v tříselné krajině. Vzniká tím, že skrze tříselný prstenec, který je normálně otevřený během nitroděložního vývoje a uzavírá se v době kolem porodu, proniká kýlní vak. U některých dětí nedojde z nejasných důvodů k uzavěru tříselného prstence. Kýlní vak pak tvoří cestu, kudy nitrobřišní orgány (u chlapců střevo, u dívek střevo nebo vaječník) pronikají do třísla, respektive u chlapců až do šourku. Kýla se často objevuje tehdy, když stoupá tlak v břišní dutině - např. při křiku. Když tlak v dutině břišní klesne, je možné kýlu „zasunout“ zpět. V některých situacích může dojít k tzv. uskřinutí kýly, tzn. že kýlu nejde „zasunout“ a hrozí akutní poškození uskřinutého orgánu. V důsledku poruchy výživy může dojít k jeho nezvratnému poškození. Tříselná kýla je problém, který se nevyřeší jinak než operací. Účelem výkonu je odstranění kýlního vaku, zpevnění břišní stěny a zabránění hrozcím komplikacím v důsledku uskřinutí.

Příprava k výkonu:

Před plánovaným zákrokem v narkóze je nezbytné minimálně 6 hodin nejíst, nepít. U pacienta je provedena příprava operačního pole a před celkovou anestézií a vlastním výkonem jsou podány zklidňující léky (tzv. premedikace).

Pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost (léky na „ředění krve“), jako Warfarin, Lawarin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Ticlid, Tagren aj., informujte o tom předem ošetřujícího lékaře.

Provedení výkonu:

Operace se provádí v celkové anestézii. Kožním řezem chirurg postupně pronikne ke kýlnímu vaku (výchlipce pobřišnice). Postupně se tento kýlní váček uvolní a odstraní. Následně se uzavře defekt ve stěně břišní, aby se kýla nemohla vrátit. Operační rána se uzavře sešitím po anatomických vrstvách.

viz obr. 1

Doporučený režim po výkonu:

Po operaci není vhodné dítě několik dní koupat, pouze omývat houbou. Malé děti si většinou omezují svou aktivitu samy podle potíží, u větších dětí je vhodné fyzické šetření po dobu asi 3 týdnů. Stehy se zpravidla vytahují sedmý den po operaci. Pokud je použit k šití vstřebatelný materiál, který se sám rozpadne, stehy se po čtrnácti dnech uvolní a vypadnou samy. Operace kýly nezpůsobuje dlouhodobější změnu zdravotní způsobilosti.

OPERACE TŘÍSELNÉ KÝLY U DĚTÍ

Poj.:

Strana 2 / 4

DG:

Č.chorobopisu:

Možné komplikace a rizika:

I při správném postupu v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy (lege artis) mohou vzniknout v souvislosti s provedeným zákrokem různé komplikace:

K všeobecným rizikům operačních zákroků patří také rozsáhlejší krvácení z operační rány; potřeba podání krevní transfuze je však při operaci kýly extrémně malá. Příležitostně se může v operační ráně nebo v šourku vytvořit větší hematoma (krevní výron), jehož ošetření si může v některých případech vyžádat další operační zákrok. V některých případech také může přetrvávat otok v operační ráně.

Zcela výjimečně může během zákroku dojít k neúmyslnému poranění střeva. Tato komplikace si může vyžádat rozšíření operačního výkonu spočívajícího v ošetření těchto poranění. Stejně tak může vzácně dojít k poranění semenného provazce či cév zásobujících varle, což může vést k atrofii varlete (jeho zmenšení) či jeho ztrátě. Přes dodržení všech preventivních opatření může dojít výjimečně k infekci operační rány. U některých pacientů může docházet ke špatnému hojení operační rány, někdy až k jejímu rozpadu. Někteří jedinci mají sklony k vytváření nadměrných, tzv. keloidních jizev.

U malého procenta pacientů může dojít k znovuoobjevení se kýly, které je nutné řešit další operací.

Přes všechna preventivní opatření nelze rovněž vyloučit některé velmi závažné a ve vzácných případech až smrtící všeobecné komplikace spojené s operací a narkózou. Patří k nim například zápal plic, kolaps části plíce (atelektáza) a jiné. K dalším rizikům patří reakce na podané léky projevující se jako mírná vyrážka až oběhové selhání a v závislosti na celkovém zdravotním stavu pacienta další komplikace.

Možné alternativy léčby:

Neexistuje žádná alternativa, která by kýlu odstranila bez operace. Pokud kýla není řešena, existuje riziko uskrtnutí nitrobrášínských orgánů v kýlním vaku s následkem jejich poškození. Tato situace je pak důvodem k urgentní operaci s mnoha možnými závažnými komplikacemi.

Prohlášení o informovaném souhlasu:

Prohlašuji, že jsem tento informovaný souhlas četl(a) a že mi bylo lékařem sděleno a vysvětleno:

- jaký je účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky, možná rizika a komplikace výkonu,
- zda plánovaný výkon má nějakou alternativu a zda mám možnost si zvolit jednu z alternativ,
- k jakým omezením v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti a změnám v pracovní způsobilosti může příslušný zdravotní výkon vést,
- jaký léčebný režim, následná zdravotní a preventivní opatření jsou vhodná po plánovaném výkonu.

Dále prohlašuji, že jsem měl(a) možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co považuji v souvislosti s navrhovaným výkonem za podstatné, a že moje dotazy mi byly lékařem zodpovězeny.

Prohlašuji, že jsem podaným informacím a vysvětlením plně porozuměl(a) a považuji své poučení za dostatečné.

Prohlašuji, že na základě své svobodné vůle a poskytnutých informací souhlasím s provedením navrhovaného zdravotního výkonu.

Souhlasím, aby v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života byly tyto výkony provedeny.

Byl(a) jsem také poučen(a) o tom, že mohu svůj souhlas s lékařským výkonem kdykoliv před zákrokem odvolat.

OPERACE TŘÍSELNÉ KÝLY U DĚTÍ

Poj.:

Strana 3 / 4

DG:

Č.chorobopisu:

Jako zákonný zástupce

~~nezletilého pacienta,~~

~~pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo~~

~~pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům~~

svým podpisem stvrzuji, že jsem obdržel příslušné informace a že tyto výše uvedené informace byly v přiměřeném rozsahu a formě též poskytnuty pacientovi.

Ve Frýdku-Místku dne: **27.6.2016 07:02**

podpis pacienta / zákonného zástupce

podpis lékaře

Podpis svědka poučení a souhlasu pacienta/zákonného zástupce, pokud pacient/zákonný zástupce není schopen se vlastnoručně podepsat:

Důvod, pro nějž pacient/zákonný zástupce není schopen se podepsat:

Způsob, jak pacient/zákonný zástupce projevilsou vůli:

Jméno, příjmení, podpis svědka: ---

podpis svědka (svědků)

OPERACE TŘÍSELNÉ KÝLY U DĚTÍ

Poj.:


Strana 4 / 4

DG:

Č.chorobopisu:

Obrazová příloha

tříselná
kýla



Obr. 1

POUZE VZOR, NEVYPLŇUJTE!