

OPERACE VARIXŮ DOLNÍCH KONČETIN

Poj.:

Strana 1 / 5

DG:

C.chorobopisu:

Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče,

vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku. Seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout dát k provedení zákroku svůj souhlas.

Zákonný zástupce pacienta: - - -

Lékař, který provedl poučení: **FlexFormClientExt**

Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče,

vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku. Seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout a dát k provedení zákroku svůj souhlas.

Účel, povaha a důsledky výkonu:

Jedná se o chirurgické odstranění chorobně rozšířených žil - varixů na dolních končetinách chirurgickou metodou. Operační výkon je prováděn z indikace léčebné nebo kosmetické. Chorobně rozšířené žíly jsou příčinou zhoršeného odtoku krve z dolních končetin. Tím je narušena výživa kůže a podkoží, což může být příčinou nehojících se defektů na bérkách, tzv. bérkových vředů. Prospěchem výkonu je zbavení se výrazné cévní kresby dolních končetin a především léčebný efekt, který brání znehodnocení podkoží a kůže na dolních končetinách.

Příprava k výkonu:

U pacienta je provedena příprava operačního pole a označení varixů na kůži. Před plánovaným zákrokem v narkóze je nezbytné minimálně 6 hodin nejíst, nepít a nekouřit. Před celkovou anestézií a vlastním výkonem jsou podány zklidňující léky (tzv. premedikace).

Pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost (léky na „ředění krve“), jako Warfarin, Lawarin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Ticlid, Tagren aj., informujte o tom předem ošetřujícího lékaře. Některé léky je nutné vysadit s předstihem před operačním zákrokem.

Provedení výkonu:

Operace je možné provádět jak v celkové anestézii, tak v epidurální anestézii, kdy se znečítlivující látka aplikuje do páteřního kanálu, čímž se „umrtví“ oblast od místa podání směrem dolů. Z nářezu kůže a podkoží v třísele je uvolněna hlavní povrchní žíla. Ta je vyreparována též nad vnitřním kotníkem a celou žílou je protažen nástroj - stripper, pomocí kterého je žíla postupně odstraněna (viz ilustrační obrázek). Následuje odstranění ostatních viditelných varikózně změněných žilních přítoků na bérce a stehně z jednotlivých malých asi 1cm dlouhých kožních řezů. Operace končí sešitím ran. Výkon může být doplněn zavedením drénu (plastikové trubičky), který má za úkol odvést krev, či tekutinu produkovanou tkáněmi. Po operaci je na celou dolní končetinu natočen měkký, podložený, elastický stahující obvaz.

viz obr. 1

Doporučený režim po výkonu:

Po operaci pacient může již druhý den zatěžovat operovanou končetinu, chodí s pomocí berlí nebo bez berlí, došlapuje. Třetí nebo čtvrtý pooperační den je proveden převaz, a na operovanou dolní končetinu je přiložen elastický kompresivní obvaz. Drén se odstraňuje v závislosti na množství odváděné tekutiny. Štehy jsou odstraněny

OPERACE VARIXŮ DOLNÍCH KONČETIN

Poj.:

Strana 2 / 5

DG:

C.chorobopisu:

sedmý až devátý den po operaci. Pacient je zpravidla propuštěn třetí den po operaci do domácí a ambulantní péče. Končetinu může pacient zatěžovat, je však důležité sledování lékařem na chirurgické ambulanci. Vstřebávání krevních podlitin na končetinách je možné urychlit pomocí mastí k tomu určených. Pracovní neschopnost je zhruba 4-6 týdnů dle rozsahu výkonu a typu pracovního zařazení. Omezení v obvyklém způsobu života trvá cca 6-8 týdnů od operace, kdy je nutné nosit kompresivní punčochy po celý den (mimo noční dobu) k zabránění vzniku pooperačního otoku.

Možné komplikace a rizika:

I při správném postupu v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy (lege artis) mohou vzniknout v souvislosti s provedeným zákrokem různé komplikace:

K všeobecným rizikům operačních zákroků patří rozsáhlejší krvácení z operační rány během operace či po ní, které si může zcela výjimečně vyžádat podání krevní transfuze. Dalším rizikem, které nelze vyloučit ani při dodržování všech preventivních opatření, je infekce operační rány.

Přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k neúmyslnému poranění hlubších cévních či nervových struktur (jedná se zejména o poranění hluboké stehenní žíly v oblasti třísla, poranění nervových struktur, nejčastěji při operaci v oblasti bérce), toto riziko je minimální. Tato poškození mohou vést k rozšíření operačního výkonu nebo k následnému operačnímu výkonu. V oblasti ran se mohou objevit výrony krve (hematom) nebo tkáňové tekutiny (serom), které se postupně vstřebávají samovolně nebo po menším chirurgickém zákroku.

Přes všechna preventivní opatření nelze rovněž vyloučit některé velmi závažné a ve vzácných případech až smrtící všeobecné komplikace spojené s operací a narkózou. Patří k nim zápal plic a kolaps části plic (atelektáza) - riziko je vyšší u kuřáků. Dále je to uzavření žil, zvláště na dolních končetinách, krevní sraženinou (tzv. trombóza) a následné uvolnění této sraženiny a její embolizace (vmetení) do plicní tepny. Riziko posledně jmenované komplikace je vyšší u ležících pacientů, kuřáků a pacientek užívajících hormonální antikoncepci. K dalším rizikům patří reakce na podané léky projevující se jako mírná vyrážka až oběhové selhání a v závislosti na celkovém zdravotním stavu pacienta další komplikace.

Po operaci nelze vyloučit, že se u některých osob varixy mohou s odstupem času objevit znovu.

Možné alternativy léčby:

Alternativou je i výkon neprovést - chorobně rozšířené žíly zůstanou na svém místě, což je příčinou zhoršeného odtoku krve z dolních končetin. Tím je narušena výživa kůže a podkoží, což může být příčinou nehojících se defektů na bérkách, tzv. bérceových vředů, které může ve zvláště těžkých případech vést až ke ztrátě končetiny. Jako alternativu je možno zvolit sklerotizaci varixů. Tato metoda je však limitována především velikostí varixů, jejich množstvím, charakterem a kvalitou kůže a podkoží

Endoskopická operace se používá pouze při přerušování spojek mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem. Metoda je minimálně bolestivá s výborným kosmetickým efektem. Metoda se nehodí pro operaci rozsáhlých varikozit. Chiva metoda je postup, při kterém se neodstraňuje hlavní povrchová žíla, ale pouze se v tříslu podvazuje a přerušuje nad vstupem do hlavní hluboké stehenní žíly. Ve stejném místě se přerušují všechny přítoky (crossectomie). Ostatní varikózně změněné žíly se odstraňují speciálním nástrojem z drobných vpichů. Laserová fotokoagulace je metoda používaná pouze na některých pracovištích jako placená služba. Je vhodná pouze k odstranění drobných varikozit.

Prohlášení o informovaném souhlasu:

Prohlašuji, že jsem tento informovaný souhlas četl(a) a že mi bylo lékařem sděleno a vysvětleno:

- jaký je účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky, možná rizika a komplikace výkonu,
- zda plánovaný výkon má nějakou alternativu a zda mám možnost si zvolit jednu z alternativ,

OPERACE VARIXŮ DOLNÍCH KONČETNIN

Poj.:

Strana 3 / 5

DG:

C. chorobopisu:

- k jakým omezením v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti a změnám v pracovní způsobilosti může příslušný zdravotní výkon vést,
- jaký léčebný režim, následná zdravotní a preventivní opatření jsou vhodná po plánovaném výkonu.

Dále prohlašuji, že jsem měl(a) možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co považuji v souvislosti s navrhovaným výkonem za podstatné, a že moje dotazy mi byly lékařem zodpovězeny.

Prohlašuji, že jsem podaným informacím a vysvětlením plně porozuměl(a) a považuji své poučení za dostatečné.

Prohlašuji, že na základě své svobodné vůle a poskytnutých informací souhlasím s provedením navrhovaného zdravotního výkonu.

Souhlasím, aby v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života byly tyto výkony provedeny.

Byl(a) jsem také poučen(a) o tom, že mohu svůj souhlas s lékařským výkonem kdykoliv před zákrokem odvolat.

Jako zákonný zástupce

~~nezletilého pacienta,~~

~~pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo~~

~~pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům~~

svým podpisem stvrzuji, že jsem obdržel příslušné informace a že tyto výše uvedené informace byly v přiměřeném rozsahu a formě též poskytnuty pacientovi.

Ve Frýdku-Místku dne: **27.6.2016 07:02**

podpis pacienta / zákonného zástupce

podpis lékaře

Podpis svědka poučení a souhlasu pacienta/zákonného zástupce, pokud pacient/zákonný zástupce není schopen se vlastnoručně podepsat:

Důvod, pro nějž pacient/zákonný zástupce není schopen se podepsat:

Způsob, jak pacient/zákonný zástupce projevil svou vůli:

Jméno, příjmení, podpis svědka: ---

OPERACE VARIXŮ DOLNÍCH KONČETNIN

Poj.:

Strana 4 / 5

DG:

C.chorobopisu:

podpis svědka (svědků)

pouze vzor, nevyplňujte!

OPERACE VARIXŮ DOLNÍCH KONČETIN


Poj.:

Strana 5 / 5

DG:

C.chorobopisu:

Obrazová příloha



Obr. 1