

OPERACE ZHOUBNÉHO NÁDORU PRSU SE ZACHOVÁNÍM PRSU

Poj.:

Strana 1 / 4

DG:

C.chorobopisu:

Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče,

vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku. Seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout dát k provedení zákroku svůj souhlas.

Zákonný zástupce pacienta: - - -

Lékař, který provedl poučení: **FlexFormClientExt**

Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče,

vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku. Seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout a dát k provedení zákroku svůj souhlas.

Účel, povaha a důsledky výkonu:

Indikací k tomuto zákroku jsou zhoubné nádory prsu. Pacientka je k operaci indikována po mezioborové konzultaci odborných lékařů z oboru radiodiagnostiky, onkologie, patologie a chirurgie. Operační léčba je jedna ze součástí komplexní onkologické péče o zhoubný nádor prsu. Prospěchem je odstranění zhoubného ložiska v prsu včetně spádových mizních uzlin a zabránění šíření nádoru do okolních orgánů.

Příprava k výkonu:

Před plánovaným zákrokem v celkové narkóze je nezbytné minimálně 6 hodin nejíst, nepít a nekouřit. U pacientky je provedena příprava operačního pole a před celkovou anestézií a vlastním výkonem jsou podány zklidňující léky (tzv. premedikace). Na odd.nukleární medicíny je do prsní žlázy aplikován koloid, který se vychytá v SLN.(Sentinelová lymfatická uzlina).Pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost (léky na „ředění“ krve), jako Warfarin, Lawarin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Ticlid, Tagren aj., informujte o tom předem ošetřujícího lékaře.

Provedení výkonu:

Po dezinfekci operačního pole a uvedení do narkózy je proveden vlastní výkon. Při něm je proveden kožní řez na prsu nad zhoubným nádorovým ložiskem, následuje odstranění ložiska s přilehlým lemem zdravé tkáně. Ze samostatného nebo téhož řezu v příslušném podpaží je odstraněna tzv. Sentinelová lymfatická uzlina (SLN) v podpaží. Je to první spádová uzlina, která první zachytí šíření nádorových buněk do lymfatických uzlin (LU) v podpaží. Jsou -li v SLN nalezeny nádorové bb je nutno rozšířit operační výkon o vyjmutí tukového tělesa podpažní jamky včetně lymfatických uzlin. Metoda SLN se neprovádí, jsou -li LU zjevně postiženy nádorem. V takovém případě se provádí přímo odstranění celého tukového tělesa podpaží s LU. Po vložení drénu, tj. plastické trubičky odvádějící sekret z rány, je operační rána uzavřena po anatomických vrstvách.
viz obr. 1

Možné komplikace a rizika:

I při správném postupu v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy (lege artis) mohou vzniknout v souvislosti s provedeným zákrokem některé komplikace.

K všeobecným rizikům operačních zákroků patří rozsáhlejší krvácení, které si vzácně může vyžádat až podání krevní transfuze. I přes dodržení všech preventivních opatření může dojít k infekci v operační ráně, která se projevuje nepřiměřeným otokem, bolestí a zarudnutím. Léčba této komplikace vyžaduje podávání antibiotik a někdy i následnou chirurgickou léčbu.

OPERACE ZHOUBNÉHO NÁDORU PRSU SE ZACHOVÁNÍM PRSU

Poj.:

Strana 2 / 4

DG:

C.chorobopisu:

Výjimečně mohou být poraněny nervy probíhající v odstraňované tukové tkáni v podpaží, což může mít za následek poruchu pohyblivosti příslušné horní končetiny či poruchu citivosti na horní končetině a přilehlé části hrudní stěny. Pooperačně také může přetrvávat bolestivost a omezení hybnosti ramenního kloubu i bez poranění nervů.

V důsledku odstranění uzlin a podvázání mizních cév může vzniknout otok (lymfedém) příslušné horní končetiny. Léčba je rehabilitační spočívající v lymfodrenáži.

V místě operační rány se může někdy vytvořit větší hematom (krevní výron) nebo nashromáždění čirá tekutina (tzv. serom). Obě komplikace si mohou vyžádat další chirurgický výkon v podobě částečného rozříznutí operační rány a vypuštění tekutiny.

I přes důkladně provedenou operaci nelze vyloučit recidivu nádorového onemocnění, která se může objevit buď v operované oblasti nebo jinde v těle.

Při odstranění většího ložiska nelze zcela vyloučit vznik deformace tvaru prsu (vpáčení v místě ložiska) a také vznik vpáčené bradavky v důsledku tahu jizvy. Pooperačně také může přetrvávat bolestivost nebo citlivost prsu.

Přes všechna preventivní opatření nelze rovněž vyloučit některé velmi závažné a ve vzácných případech až smrtící všeobecné komplikace spojené s operací a celkovou narkózou. Patří k nim zápal plic a kolaps části plíce (atelektáza) - riziko je vyšší u kuřáků. Dále je to uzavření žil, zvláště na dolních končetinách, krevní sraženinou (tzv. trombóza) a následné uvolnění této sraženiny a její embolizace (vmetení) do plicní tepny. Riziko posledně jmenované komplikace je vyšší u ležících pacientů, kuřáků a pacientek užívajících hormonální antikoncepci. K dalším rizikům patří reakce na podané léky projevující se jako mírná vyrážka až oběhové selhání a v závislosti na celkovém zdravotním stavu pacienta další komplikace.

Možné alternativy léčby:

Neoperační postup - onkologická léčba (ozáření, chemoterapie, hormonální či biologická léčba), ty však nemohou samostatně vést k úplnému uzdravení.

V některých případech jiná onkologická léčba. Bez operace však není možné očekávat úplné odstranění nádoru z organismu.

Prohlášení o informovaném souhlasu:

Prohlašuji, že jsem tento informovaný souhlas četl(a) a že mi bylo lékařem sděleno a vysvětleno:

- jaký je účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky, možná rizika a komplikace výkonu,
- zda plánovaný výkon má nějakou alternativu a zda mám možnost si zvolit jednu z alternativ,
- k jakým omezením v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti a změnám v pracovní způsobilosti může příslušný zdravotní výkon vést,
- jaký léčebný režim, následná zdravotní a preventivní opatření jsou vhodná po plánovaném výkonu.

Dále prohlašuji, že jsem měl(a) možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co považuji v souvislosti s navrhovaným výkonem za podstatné, a že moje dotazy mi byly lékařem zodpovězeny.

Prohlašuji, že jsem podaným informacím a vysvětlením plně porozuměl(a) a považuji své poučení za dostatečné.

Prohlašuji, že na základě své svobodné vůle a poskytnutých informací souhlasím s provedením navrhovaného zdravotního výkonu.

Souhlasím, aby v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů

OPERACE ZHOUBNÉHO NÁDORU PRSU SE ZACHOVÁNÍM PRSU

Poj.:

Strana 3 / 4

DG:

C.chorobopisu:

nutných k záchraně mého života byly tyto výkony provedeny.

Byl(a) jsem také poučen(a) o tom, že mohu svůj souhlas s lékařským výkonem kdykoliv před zákrokem odvolat.

Jako zákonný zástupce

~~nezletilého pacienta,~~

~~pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo~~

~~pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům~~

svým podpisem stvrzuji, že jsem obdržel příslušné informace a že tyto výše uvedené informace byly v přiměřeném rozsahu a formě též poskytnuty pacientovi.

Ve Frýdku-Místku dne: **27.6.2016 07:02**

podpis pacienta / zákonného zástupce

podpis lékaře

Podpis svědka poučení a souhlasu pacienta/zákonného zástupce, pokud pacient/zákonný zástupce není schopen se vlastnoručně podepsat:

Důvod, pro nějž pacient/zákonný zástupce není schopen se podepsat:

Způsob, jak pacient/zákonný zástupce projev il svou vůli:

Jméno, příjmení, podpis svědka: ---

podpis svědka (svědka,

OPERACE ZHOUBNÉHO NÁDORU PRSU SE ZACHOVÁNÍM PRSU

Poj.:


Strana 4 / 4

DG:

C.chorobopisu:

Obrazová příloha

Odstranění zhoubného nádoru se zachováním prsu



Obr. 1

pouze vzor, nevyplňujte!