

## Plastická operace ptózy

Poj.:

Strana 1 / 3

DG:

C.chorobopisu:

Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče,

vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku. Seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout dát k provedení zákroku svůj souhlas.

Zákonný zástupce pacienta: - - -

Lékař, který provedl poučení: **FlexFormClientExt**

### Co je ptóza?

Plastickou úpravou dosáhnout optimálního postavení víčka.

### Co je účelem operačního zákroku?

Plastickou úpravou dosáhnout optimálního postavení víčka.

### Jak se připravit na zákrok?

U pacientů užívajících léky s antikoagulačním účinkem (Warfarin) je třeba po konzultaci s praktickým lékařem tyto léky vysadit nebo přechodně nahradit jinými léky (nízkomolekulární heparin v injekční formě). Pacienti užívající léky na ředění krve tzv. antiagregancia (např. Godasal, Anopyrin, Stacyl) by měli 5 dní před zákrokem tyto léky vynechat.

### Jak se provádí plastická operace na kůži očních víček a obličeje?

Zárok se provádí na operačním sále vleže, pacient je kromě oka a jeho okolí kryt rouškou. Po desinfekci operačního pole a zakrytí sterilní rouškou se provede lokální umrtvení daného místa injekcí. Při operaci se nejčastěji z kožního řezu zpevňuje úpon zvedače horního víčka, přičemž se i redukuje nadbytek kůže. Kožní rána se sešije jednotlivými stehy nebo pokračujícím stehem. Na ránu se aplikuje mast a sterilně se překryje.

### Jaký je režim po zákroku?

Další den po zákroku se provádí kontrola s převazem na oční ambulanci. Obvykle si po dobu 1 týdne pacient aplikuje na operované víčko léčebnou mast. Po této době se doporučuje režim bez větší fyzické zátěže a udržování jizvy v suchu. Stehy se vytažují cca po týdně.

### Jaké mohou být operační komplikace?

- Alergická reakce na lokální umrtvení nebo desinfekční látku - nutná protialergická terapie. Její intenzita závisí od závažnosti alergické reakce.
- Krvácení při zákroku - k drobnému krvácení dochází při každém chirurgickém zákroku. K výraznějšímu krvácení dochází při užívání antikoagulační nebo antiagregační terapie, která se proto před zákrokem vysazuje.
- Okulokardiální reflex - při tlaku na oko nebo při manipulaci s očním bulbem může dojít u citlivých jedinců k vyvolání okulokardiálního reflexu, projevující se jako prekolapsový, či kolapsový stav na podkladě snížení krevního tlaku. Pravděpodobnost vzniku projevů je výrazně snížena již samotnou horizontální polohou při zákroku.

### Jaké mohou být běžnější pooperační komplikace?

1. Vytvoření podkožního hematomu a otoku víček - drobné modřiny a otok vznikají v důsledku porušení celistvosti kůže a narušení drobných cév kůže, anebo i podkoží. Do 2 týdnů postupně odeznívají.

## Plastická operace ptózy

Poj.:

Strana 2 / 3

DG:

C.chorobopisu:

2. Syndrom suchého oka - pocit písku v očích, pocit pálení, nadměrné slzení se může u predisponovaných jedinců objevit či zhoršit.

### Jaké mohou být výjimečné pooperační komplikace?

1. Vznik kosmeticky nevyhovujících jizev - vznik výrazných nerovných nebo vystouplých jizev, které deformují kůži v daném místě. Tato komplikace je operačním postupem neovlivnitelná, vznikají u jedinců predisponovaných ke vniku těchto jizev.
2. Nedostatečná nebo „přetažená“ plastická úprava
3. Nepravidelná kontura víčka
4. Asymetrie očních štěrbin
5. Rozestup ran
6. Hyperpigmentace jizvy - může vzniknout po expozici slunečnímu záření (léto)
7. Milia - zavzetím vývodů drobných kožních žlázek do jizvy mohou vzniknout „hrbolky“
8. Retrobulbární krvácení - velmi vzácné - krvácení za okem se projevuje protruzí bulbu, bolestí, zvýšeným nitroočním tlakem a při neléčení může vést ke slepotě

### Co se může přihodit, pokud výkon nepodstoupím?

Ptóza může progredovat a omezovat tak zorné pole nebo i znemožnit vidění.

### Jaké jsou alternativy zákroků?

Výkon nemá alternativu.

### Prohlášení o informovaném souhlasu:

Prohlašuji, že jsem tento informovaný souhlas čer(a) a že mi bylo lékařem sděleno a vysvětleno:

- jaký je účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky, možná rizika a komplikace výkonu,
- zda plánovaný výkon má nějakou alternativu a zda mám možnost si zvolit jednu z alternativ,
- k jakým omezením v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti a změnám v pracovní způsobilosti může příslušný zdravotní výkon vést,
- jaký léčebný režim, následná zdravotní a preventivní opatření jsou vhodná po plánovaném výkonu.

Dále prohlašuji, že jsem měl(a) možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co považuji v souvislosti s navrhovaným výkonem za podstatné, a že moje dotazy mi byly lékařem zodpovězeny.

Prohlašuji, že jsem podaným informacím a vysvětlením plně porozuměl(a) a považuji své poučení za dostatečné.

Prohlašuji, že na základě své svobodné vůle a poskytnutých informací souhlasím s provedením navrhovaného zdravotního výkonu.

Souhlasím, aby v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života byly tyto výkony provedeny.

Byl(a) jsem také poučen(a) o tom, že mohu svůj souhlas s lékařským výkonem kdykoliv před zákrokem odvolat.

## Plastická operace ptózy

Poj.:

Strana 3 / 3

DG:

C.chorobopisu:

Jako zákonný zástupce

~~nezletilého pacienta,~~

~~pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo~~

~~pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům~~

svým podpisem stvrzuji, že jsem obdržel příslušné informace a že tyto výše uvedené informace byly v přiměřeném rozsahu a formě též poskytnuty pacientovi.

Ve Frýdku-Místku dne: **27.6.2016 07:02**

-----  
podpis pacienta / zákonného zástupce

-----  
podpis lékaře

Podpis svědka poučení a souhlasu pacienta/zákonného zástupce, pokud pacient/zákonný zástupce není schopen se vlastnoručně podepsat:

**Důvod, pro nějž pacient/zákonný zástupce není schopen se podepsat:**

- - -

**Způsob, jak pacient/zákonný zástupce projevil svou vůli:**

- - -

Jméno, příjmení, podpis svědka: - - -

-----  
podpis svědka (svědků)