

Ajmalinový test

Poj.:

Strana 1 / 3

DG:

C.chorobopisu:

Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče,

vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku. Seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout dát k provedení zákroku svůj souhlas.

Zákonný zástupce pacienta: - - -

Lékař, který provedl poučení: **FlexFormClientExt**

Účel a povaha výkonu

Co je to ajmalinový test:

Ajmalinový test je diagnostickým testem, který se provádí u pacientů s podezřením na syndrom Brugadaových. Tento syndrom je projevem genetických abnormalit, které vedou k poruše šíření elektrických vzruchů v srdeční svalovině a mohou vést ke vzniku život ohrožujících arytmií. Zmíněné poruchy lze odkrýt podáním léku, který se nazývá ajmalin. Jde o blokátor sodíkových kanálů v srdci, který je schopen vyvolat v nejasných případech charakteristické změny na EKG křivce, a tím potvrdit diagnózu syndromu Brugadaových. U pacientů s normálními srdečními buňkami má ajmalin malý nebo žádný účinek na EKG. Cílem ajmalinového testu je vyvolání změn na EKG, které jsou diagnostické pro syndrom Brugadaových.

Režim pacienta před výkonem

Před vyšetřením cca 4 hodiny nejezte a nekuřte, pit můžete až do cca 1 hodiny před vyšetřením. Pokud berete pravidelně léky, nemusíte je vysazovat.

Postup výkonu

Ajmalinový test je nejbezpečnější provádět na IP či elektrofyziologickém sále. Vlastní podání ajmalinu do žíly se provádí formou pomalé infuze za současného monitorování životních funkcí (monitorování krevního tlaku a EKG) v přítomnosti školeného personálu (lékaři a zdravotní sestry). Je potřeba pacienta monitorovat ještě určitou dobu po podání léku.

Režim pacienta po výkonu

Efekt ajmalinu je krátkodobý, pacient může být v průběhu několik hodin (v průměru 2 hod.) po dokončení testu propuštěn domů. Pokud by se během testu vyvolala arytmie, bude potřeba přijetí k hospitalizaci, monitorace a dořešení.

Výhody výkonu

Navrhované použití ajmalinového testu nám může poskytnout důležitou informaci o rizicích život ohrožujících poruch srdečního rytmu.

Možné komplikace

Rizika ajmalinového testu jsou poměrně malá a komplikace nebývají časté. V průběhu podávání infuze s ajmalinem můžete cítit kovovou chuť v ústech, návaly horka, necitlivost kolem rtů nebo rozmazané vidění. Tyto nežádoucí účinky obvykle po ukončení podávání rychle vymizí. Vzácně může vzniknout alergická reakce nebo spontánně život ohrožující arytmie, kdy je nutné provést elektrickou kardioverzi nebo defibrilaci v krátkodobém uspání. Alternativně může dojít i ke vzniku bradykardie (pomalá srdeční frekvence), tento stav lze ovlivnit medikamentózně. Po vyšetření je velmi malá pravděpodobnost výskytu arytmií.

Ajmalinový test

Poj.:

Strana 2 / 3

DG:

C. chorobopisu:

Alternativy léčby

K ajmalinovému testu neexistuje alternativa, která by dovolila získat potřebné diagnostické informace. Alternativou je rovněž i výkon neprovést. Váš lékař však indikoval tento test, aby mohl doporučit další postup ve vyšetřování a event. léčbě. Bez výsledku testu nebude lékař mít důležitou informaci o riziku život ohrožujících poruch srdečního rytmu.

Možná omezení v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti nebo zdravotní způsobilosti

Po vyšetření není zásadní omezení, je potřeba požádat rodinného příslušníka či známého, aby Vás při cestě domů doprovodil. Po testu není vhodné řídit motorové vozidlo.

Doplňující údaje o výkonu

Vše s Vámi bude ještě probráno těsně před vyšetřením. Případné nejasnosti či dotazy a veškeré informace, které jsou pro Vás důležité, adresujte na provádějícího lékaře ještě před zahájením vyšetření.

Prohlášení o informovaném souhlasu:

Prohlašuji, že jsem tento informovaný souhlas četl(a) a že mi bylo lékařem sděleno a vysvětleno:

- jaký je účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky, možná rizika a komplikace výkonu,
- zda plánovaný výkon má nějakou alternativu a zda mám možnost si zvolit jednu z alternativ,
- k jakým omezením v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti a změnám v pracovní způsobilosti může příslušný zdravotní výkon vést,
- jaký léčebný režim, následná zdravotní a preventivní opatření jsou vhodná po plánovaném výkonu.

Dále prohlašuji, že jsem měl(a) možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co považuji v souvislosti s navrhovaným výkonem za podstatné, a že moje dotazy mi byly lékařem zodpovězeny.

Prohlašuji, že jsem podaným informacím a vysvětlením plně porozuměl(a) a považuji své poučení za dostatečné.

Prohlašuji, že na základě své svobodné vůle a poskytnutých informací souhlasím s provedením navrhovaného zdravotního výkonu.

Souhlasím, aby v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života byly tyto výkony provedeny.

Byl(a) jsem také poučen(a) o tom, že mohu svůj souhlas s lékařským výkonem kdykoliv před zákrokem odvolat.

Jako zákonný zástupce

~~nezletilého pacienta,~~

~~pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo~~

~~pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům~~

svým podpisem stvrzuji, že jsem obdržel příslušné informace a že tyto výše uvedené informace byly v přiměřeném rozsahu a formě též poskytnuty pacientovi.

Ajmalinový test

Poj.:

Strana 3 / 3

DG:

C.chorobopisu:

Ve Frýdku-Místku dne: 27.6.2016 07:02

podpis pacienta / zákonného zástupce

podpis lékaře:

Podpis svědka poučení a souhlasu pacienta/zákonného zástupce, pokud pacient/zákonný zástupce není schopen se vlastnoručně podepsat:

Důvod, pro nějž pacient/zákonný zástupce není schopen se podepsat:

- - -

Způsob, jak pacient/zákonný zástupce projevil svou vůli:

- - -

Jméno, příjmení, podpis svědka: - - -

podpis svědka (svědků)