

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM (NEU)

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

Kaudální blokáda

Poj.:	Strana
DG:	
Č.chorobopisu:	

Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče,
Vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku. Seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout a dát k provedení zákroku svůj souhlas.

Zákonný zástupce /opatrovník pacienta

Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště:

Kontaktní telefon:

Vztah k pacientovi:

.....
Lékař, který provedl poučení (jmenovka
- tiskne se z Akordu):

Účel a povaha výkonu

Kaudální blokádou se rozumí aplikace léků pomocí jehly zavedené do prostoru páteřního kanálu před tvrdou plenu míšní v oblasti přechodu křížové kosti a kostrče. Do tohoto prostoru se podávají léky k tišení bolesti (místní anestetika, analgetika) a léky k potlačení zánětu (kortikosteroidy). Pomocí většího objemu takto aplikovaného léku (20 - 30ml místního anestetika) lze rovněž (kromě tišení bolesti) rozrušit pozánětlivé srůsty.

Režim pacienta před výkonem

Před výkonem je třeba informovat lékaře, zda netrpíte zvýšenou krvácivostí, alergií, nebo zda neužíváte léky ovlivňující krevní srážlivost. Určí-li to lékař předem, je nutné mít provedeno laboratorní vyšetření (odběr krve) se zaměřením na ukazatele krevní srážlivosti. Před samotným výkonem je pacientovi změřen krevní tlak a puls.

Postup výkonu

Zákrok se provádí vleže na břiše. V této poloze lze nejlépe vyhledat budoucí místo k zavedení speciální jehly. Po desinfekci následuje vpich tenkou jehlou a znecitlivění kůže a podkoží malým množstvím místního anestetika. Několik minut se vyčká na účinek anestetika a následně je do určeného prostoru zavedena delší jehla. Bezprostředně po aplikaci je jehla samotná odstraněna.

Aplikaci léků provádí lékař, který je školený v řešení eventuálních komplikací.

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM (NEU)

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

K provedení jakékoliv z technik místního znecitlivění je mj. potřeba Vaší spolupráce [zaujetí správné polohy, informování o případných vjemech při aplikaci, nehybnost v krátkých časových úsecích aplikace léků] - jako jednoho ze základních předpokladů úspěšného a bezpečného zajištění místního znecitlivění a prevence vzniku komplikací.

Režim pacienta po výkonu

Po aplikaci léků má pacient setrvat v sedě nebo v polosedě nejméně 30 minut - v čekárně u ambulantního výkonu, nebo na nemocničním lůžku u hospitalizace. Po 30 minutách je přeměřen krevní tlak a tepová frekvence. Pokud nejsou subjektivní potíže, může pacient odejít domů, ideálně v doprovodu druhé osoby. Hospitalizovaní pokračují v naplánovaném diagnostickém a léčebném postupu na oddělení. V den aplikace opichu je nutný klidový režim.

Následky výkonu

Správně podaná a nekomplikovaná aplikace léků kaudálním přístupem nemá žádné trvalé následky.

Možné komplikace

U tohoto zákroku jsou komplikace jen výjimečné:

- nechtěná punkce tvrdé míšní pleny - obvykle nepůsobí obtíže, výjimečně může způsobit přechodné bolesti hlavy
- bolesti zad, mravenčení v oblasti konečníku a hráze, svědění kůže, přechodná porucha hybnosti dolních končetin
- hematom v místě vpichu, přechodná porucha vyprazdňování močového měchýře
- bolestivé podráždění/poškození míšního nervu s oslabením svalu a trvající poruchou citlivosti v inervované oblasti
- zánět v místě aplikace anestetika, zánět či hematom v páteřním kanálu
- alergická reakce na podané anestetikum, nepoznaná aplikace anestetika do cévního systému
- pokles krevního tlaku (pocit malátnosti, pocit spavosti, nevolnost, zvracení)
- centrální útlum dýchání

Alternativy léčby

Přímé účinky místně podaných léků nelze nahradit jinou cestou, jedná se o speciální postup, obvykle v rámci komplexního řešení problematiky bolesti zad, většinou po vyčerpání jiných, méně invazivních standardních způsobů analgetizace. Určitou alternativou [ne ovšem vždy vhodnou a stejně efektivní] může být aplikace těchto léků ve vyšší etáži páteře - bederní oblasti - do epidurálního prostoru.

Prohlášení o informovaném souhlasu:

Prohlašuji, že jsem tento informovaný souhlas četl(a) a že mi bylo lékařem sděleno a vysvětleno:

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM (NEU)

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

- jaký je účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky, možná rizika a komplikace výkonu,
- zda plánovaný výkon má nějakou alternativu a zda mám možnost si zvolit jednu z alternativ,
- k jakým omezením v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti a změnám v pracovní způsobilosti může příslušný zdravotní výkon vést,
- jaký léčebný režim, následná zdravotní a preventivní opatření jsou vhodná po plánovaném výkonu.

Dále prohlašuji, že jsem měl(a) možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co považuji v souvislosti s navrhovaným výkonem za podstatné, a že moje dotazy mi byly lékařem zodpovězeny.

Prohlašuji, že jsem podaným informacím a vysvětlením plně porozuměl(a) a považuji své poučení za dostatečné.

Prohlašuji, že na základě své svobodné vůle a poskytnutých informací souhlasím s provedením navrhovaného zdravotního výkonu.

.....
podpis pacienta

Jako zákonný zástupce /opatrovník svým podpisem stvrzuji, že jsem obdržel příslušné informace a že tyto výše uvedené informace byly v přiměřeném rozsahu a formě též poskytnuty pacientovi.

.....
podpis zákonného zástupce /opatrovníka

Stanovisko nezletilého pacienta (vždy u věku 14 a více let nebo úměrně rozumově vyspělého). S provedením navrhovaného zdravotního výkonu nezletilý pacient:

☐ *souhlasí* ☐ *nesouhlasí*

V případě nesouhlasu, uveďte důvod.

Pacient není schopen podpisu. Uveďte důvod

.....
jmenovka a podpis lékaře

Svůj souhlas vyjádřil (uveďte způsob)

Jméno, příjmení svědka:

.....
podpis svědka (svědků)